

| | |
|-------|---------|
| レジメン名 | 10DTX療法 |
|-------|---------|

| | |
|-------|-------|
| 1 クール | 21 日間 |
|-------|-------|

| 分類 | GpNo. | 薬剤／手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------|---------|--------|
| 注射 |  | | | | |
| | 1 | DIV 点滴注射 | | | 時間未定 |
| | | 15 分で | | | |
| | | ○生理食塩液比加 [50mLV] | 1 瓶 | | |
| | | ○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン) | 1 瓶 | | |
| | | ○ホ®ラミン注5mg | 1 管 | | |
| | 2 | DIV 点滴注射 | | | 時間未定 |
| | | 60 分で | | | |
| | | ﾌﾄﾖ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液) | 1 袋 | | |
| | | ○ﾄﾂｷｾﾞﾙ点滴静注液 80mg/4mL「ヤクルト」(タキソテル) | 60 mg /m ² | | |
| | | DEHPフリー | | | |
| | 3 | DIV 点滴注射 | | | 時間未定 |
| | | 15 分で | | | |
| | | ○生理食塩液比加 [50mLV] | 1 瓶 | | |
| 処方 | | | | | |
| コメント | | DTX投与量60-75mg/m ² | | | |