

レジメン名	6CPA+DTX (TC) 療法
-------	------------------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	DIV 点滴注射			時間未定	
		15 分で				
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
		○ホ®ラミン注5mg	1 管			
	2	DIV 点滴注射			時間未定	
		60 分で				
		ﾌｵﾄｳ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○ﾄﾍﾞｷｾﾙ点滴静注液 80mg/4mL「ヤクルﾄ」(タキソﾍﾙ)	60 mg /m <sup>2</sup>			
		DEHPﾌﾘｰ				
	3	DIV 点滴注射			時間未定	
		30 分で				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		○ｲﾝﾄｷｻﾝ500mg[注射用]	600 mg /m <sup>2</sup>			
処方	4	DIV 点滴注射			時間未定	
		15 分で				
		○生理食塩液ﾋｶﾘ [50mLV]	1 瓶			
処方						
	1				●	→
		○ﾃｶﾄﾞﾝ錠4mg	2 錠			
コメント		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
		ADR総投与量500mg/m <sup>2</sup>				