

レジメン名	4FEC療法
-------	--------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射							
	1	DIV 点滴注射			時間未定		
		15 分で					
		○グラニセロン点滴静注パック1mg/50mL「テバ」	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
		EPI投与60分前イミット内服					
	2	DIV 点滴注射			時間未定		
		全開で					
		ブドウ糖注射液 5% [100mLV]	1 瓶				
		EPI必要量の5%ブドウ糖量を抜く。					
		○エピルビシン塩酸塩注射液 50mg(ファルモルビシンRTU)	100 mg /m ²				
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管				
処方							
	1				●		
		○イミットカプセル125mg	1 C				
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法当日。エピルビシン投与の60分前 に内服。					
	2				●	→	
		○イミットカプセル80mg	1 C				
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法2、3日目。それぞれ朝食後に内 服。					
	3				●	→	→
		○デカトロン錠4mg	2 錠				
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。					
	コメント	EPI: 60~100mg/m ² 総投与量800~900mg/m ²					

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。