

レジメン名	5AC療法
-------	-------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射							
	1	DIV 点滴注射			時間未定		
		15 分で					
		○グラニセトロン点滴静注パック1mg/50mL〔テバ〕	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg〔2mL/瓶〕(テカトロン)	1 瓶				
		○デキサート注射液1.65mg〔0.5mL/A〕(テカトロン)	2 管				
		ADR投与60分前イミト内服					
	2	DIV 点滴注射			時間未定		
		全開で					
		○生理食塩液比加〔50mLV〕	1 瓶				
		○ドキシルピシン塩酸塩注射液50mg(アトリアシン)	60 mg /m ²				
	3	DIV 点滴注射			時間未定		
処方							
	1				●		
		○イミトカプセル125mg	1 C				
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法当日。ドキシルピシン投与の60分前 に内服。					
	2				●	→	
		○イミトカプセル80mg	1 C				
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法2、3日目。それぞれ朝食後に内 服。					
	3				●	→	→
		○デカトロン錠4mg	2 錠				
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。					
	コメ	ADR総投与量500mg/m ²					

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。