

レジメン名	FOLFIRI+Pmab療法
-------	----------------

1 クール	14 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	IVH1 中心静脈注射			時間未定	
		○生理食塩液七加 [50mLV]	1 瓶			
	2	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		60分で				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		○ペクチン点滴静注用100mg	6 mg /kg			
		フィルター付きセット使用				
	3	DIV 点滴注射			時間未定	
		○生理食塩液七加 [50mLV]	1 瓶			
	4	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		30分で				
		○アロキン点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
	5	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp6と同時投与 90分で				
		ブドウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	150 mg /m ²			
	6	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp5と同時投与 120分で				
		生理食塩液 [250mLB]	1 袋			
		○レボリナート点滴静注用 100mg「トワ」(アイソリン)	200 mg /m ²			

	7	IV 静脈内注射		時間未定	
		Rp6終了直後 bolus			
		○フルオウラシル注1000mg「トーフ」	400 mg /m ²		
	8	IVH1 中心静脈注射		時間未定	
		フラッシュ			
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶		
	9	IVH1 中心静脈注射(速度指示)		時間未定	
		Rp8終了後接続 460時間持続でCVポートから			
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶		
		SV2.5で全量100mLとする			
処方		○フルオウラシル注1000mg「トーフ」	2400 mg /m ²		
	10	IVH1 中心静脈注射		時間未定	
		○ヘパリンNa0.7%100U/mLシリンジオートカ10mL	1 筒		
					
	1			●	→
		○デカドロン錠4mg	2 錠		
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。			
コメント		UGT1A1がタケタヘロはCPT投与量70-80%に減量。 day2-3、デカドロン8mg内服。			

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。