

レジメン名	mFOLF0X6+Bmab療法
-------	-----------------

1 クール	14 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	IVH1 中心静脈注射			時間未定	
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶			
	2	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		初回90分→60分→30分				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		○アバズチ点滴静注用400mg/16mL	5 mg /kg			
	3	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		30分で				
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg [2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg [0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
	4	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp5と同時投与 120分で				
		ブトウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サント」	85 mg /m ²			
	5	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp4と同時投与 120分で				
		生理食塩液 [250mLB]	1 袋			
		○レボネリナート点滴静注用 100mg「トーワ」(アイソホリン)	200 mg /m ²			
	6	IV 静脈内注射			時間未定	
		Rp4、5終了直後 bolus				
		○フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	400 mg /m ²			

	7	IVH1 中心静脈注射		時間未定	
		フラッシュ			
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶		
	8	IVH1 中心静脈注射(速度指示)		時間未定	
		Rp7終了後接続 46時間持続でCVポートから			
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶		
		SV2.5で全量100mLとする			
		○フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	2400 mg /m ²		
	9	IVH1 中心静脈注射		時間未定	
		○ヘパリンNa0.9%100U/mLシリンジオーツカ10mL	1 筒		
処方					
	1			●	→
		○デカドロン錠4mg	2 錠		
コメント		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。			
		day2-3、デカドロン8mg内服。			

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。