

レジメン名	FOLFIRI+Aflibercept療法
-------	-----------------------

1 クール	14 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		15分で				
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
	2	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		60分で				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		○ザルトラップ点滴静注200mg/8mL	4 mg /kg			
		0.2μのフィルター使用				
	3	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp4と同時投与 90分で				
		ブトウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイウ」	150 mg /m ²			
	4	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp3と同時投与 120分で				
		生理食塩液 [250mLB]	1 袋			
		○レボリナート点滴静注用 100mg「トーワ」(アイソボリン)	200 mg /m ²			
	5	IV 静脈内注射			時間未定	
		Rp4終了直後 bolus				
		○フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	400 mg /m ²			
	6	IVH1 中心静脈注射			時間未定	
		フラッシュ				
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶			

	7	IVH1 中心静脈注射(速度指示)		時間未定	
		Rp6終了後接続 46時間持続でCVポートから			
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶		
		SV2.5で全量100mLとする			
		○フルオウラル注1000mg「トーフ」	2400 mg /m ²		
処方	8	IVH1 中心静脈注射		時間未定	
		○ヘパリンNa0.7%100U/mLシリンジオートカ10mL	1 筒		
					
	1			●	→
		○デカドロン錠4mg	2 錠		
コメント		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の日から内服。 UGT1A1がワイルド型はCPT投与量70-80%に減量。 day2-3、デカドロン8mg内服。			

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。