



レジメン名	XELIRI+Bmab療法
-------	---------------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	DIV 点滴注射			時間未定	
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶			
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		初回90分→60分→30分				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		○アバスタ点滴静注用400mg/16mL	7.5 mg /kg			
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		30 分で				
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		90 分で				
		ブドウ糖注射液 5% [500mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○イリナカ塩酸塩点滴静注液100mg「タイウ」	200 mg /m <sup>2</sup>			
処方						
	1				●	→
		○デカトロン錠4mg	2 錠			
コメント		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
		カベンチン1600mg/m <sup>2</sup> /day、day1夕-day15朝内服、day15夕-day21休。 day2-3、DEX8mg内服 UGT1A1遺伝子多型を有する場合の開始用量は150mg/m <sup>2</sup> とする。				