

レジメン名	FOLFIRI療法
-------	-----------

1 クール	14 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射	1	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		30分で				
		○アロキン点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
	2	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp3と同時投与 90分で				
		ブドウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	150 mg /m <sup>2</sup>			
	3	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp2と同時投与 120分で				
		生理食塩液 [250mLB]	1 袋			
		○レボリナート点滴静注用 100mg「トーワ」(アイソリン)	200 mg /m <sup>2</sup>			
	4	IV 静脈内注射			時間未定	
		Rp3終了直後 bolus				
		○フルオウラシル注1000mg「トーワ」	400 mg /m <sup>2</sup>			
	5	IVH1 中心静脈注射			時間未定	
		フラッシュ				
		○生理食塩液追加 [50mLV]	1 瓶			
	6	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp5終了後接続 468時間持続でCVポートから				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		SV2.5で全量100mLとする				
		○フルオウラシル注1000mg「トーワ」	2400 mg /m <sup>2</sup>			
	7	IVH1 中心静脈注射			時間未定	
		○ヘパリンNa注射液100U/mLシリンジオートカ10mL	1 筒			
処方						
	1				●	→
		○デカトロン錠4mg	2 錠			
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
コメント		UGT1A1がワイルドタイプはCPT投与量70-80%に減量。 day2-3、デカドロン8mg内服。				

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。