

レジメン名	mFOLF0X6療法
-------	------------

1 クール	14 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		30分で				
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
	2	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp3と同時投与 120分で				
		ブドウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サント」	85 mg /m ²			
	3	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp2と同時投与 120分で				
		生理食塩液 [250mLB]	1 袋			
		○レボネリナート点滴静注用 100mg「トーフ」(アインホリン)	200 mg /m ²			
	4	IV 静脈内注射			時間未定	
		Rp2,3終了直後 bolus				
		○フルオウラシル注1000mg「トーフ」	400 mg /m ²			
	5	IVH1 中心静脈注射			時間未定	
		フラッシュ				
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶			
処方	6	IVH1 中心静脈注射(速度指示)			時間未定	
		Rp5終了後接続 46時間持続でCVポートから				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		SV2.5で全量100mLとする				
		○フルオウラシル注1000mg「トーフ」	2400 mg /m ²			
	7	IVH1 中心静脈注射			時間未定	
		○ヘパリンNaドック100U/mLシリンジオーツカ10mL	1 筒			
					●	→
	1	○デカトロン錠4mg	2 錠			
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
コメント		day2-3、デカドロン8mg内服。				

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。