

レジメン名	CPT-11+Pmab療法
-------	---------------

1 クール	14 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	DIV 点滴注射			時間未定	
		○生理食塩液に加 [50mLV]	1 瓶			
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		60 分で				
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶			
		○ペグテリクス点滴静注用100mg	6 mg /kg			
		フィルター付きセット使用				
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		30 分で				
		○生理食塩液に加 [50mLV]	1 瓶			
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		30 分で				
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
	5	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		90 分で				
		ブドウ糖注射液 5% [500mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	150 mg /m <sup>2</sup>			
	6	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		15 分で				
		○生理食塩液に加 [50mLV]	1 瓶			
処方					●	→
	1					
		○デカトロン錠4mg	2 錠			
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
コメント		UGT1A1がホモ・タリヘテロはCPT投与量70-80%に減量。 day2-3、デカトロン8mg内服。				