

レジメン名	CDDP+GEM療法
-------	------------

1 クール	28 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(8)	day(15)
注射											
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定					時間未定	時間未定
		15 分で									
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶								
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶								
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定					時間未定	時間未定
		30 分で									
		ブドウ糖注射液 5% [100mLV]	1 瓶								
		○ゲムシル点静注用1g(ジェムザール)	1000 mg /m ²								
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定						
		朝までキープ									
		YDソルター-T3号輸液[500mL]	1 袋								
	4	DIV 点滴注射(速度指示)								時間未定	時間未定
		全開									
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶								
	5	DIV 点滴注射(速度指示)				時間未定					
		120分で									
		ソルアセトF輸液 [500mL](ウーイーンF)	1 袋								
	6	DIV 点滴注射(速度指示)				時間未定					
		120分で									
		ソルアセトF輸液 [500mL](ウーイーンF)	1 袋								
		シス投与60分前イムト内服									
	7	DIV 点滴注射(速度指示)				時間未定					
		15 分で									
		○グラニセトロン点静注パッケ1mg/50mL「テバ」	1 袋								
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶								
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管								

注射	8	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定					
		120分で								
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋							
		○シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	70 mg /m ²							
		遮光、全量500mLとする。								
	9	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定					
		180分で								
		CDDP開始時から側管より								
		○20%マンニトール注射液「YD」[300mL]	1 瓶							
	10	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定					
		15 分で								
		○ケラニセトロン点滴静注パック1mg/50mL「テバ」	1 袋							
処方	11	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定					
		120分で								
		YDソルター-T3号輸液[500mL]	1 袋							
	12	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定					
		120分で								
		YDソルター-T3号輸液[500mL]	1 袋							
	13	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定					
		翌朝までキープ								
		YDソルター-T3号輸液[500mL]	1 袋							
										
	1				●					
		○イミドカフセル125mg	1 C							
コメント		【分1】1日1回:医師の指示通り シスプラチン投与当日、シスプラチン投与の60分前に内服								
						●	→			
	1									
		○イミドカフセル80mg	1 C							
		【分1】1日1回:医師の指示通り シスプラチン投与後2、3日目、それぞれ朝食後に内服。								
コメント	2					●	→	→		
		○デカドロン錠4mg	2 錠							
		【分1】1日1回:朝食後 シスプラチン投与翌日から内服。								
コメント		day3-5、デカドロン8mg内服。								

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。