

レジメン名	CBDCA+GEM療法
-------	-------------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(8)
注射							
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
		15 分で					
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管				
	2	DIV 点滴注射(速度指示)					時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		時間未定
		30 分で					
		ブドウ糖注射液 5% [100mLV]	1 瓶				
		○ゲムシ処点点滴静注用1g(ジェムザール)	1000 mg /m ²				
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
処方		60 分で					
		ブドウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋				
		○カルボプラチン点滴静注液450mg[サント]	5 mg /AUC× (GFR+25)				
	5	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		時間未定
		全開					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
							
	1				●	→	
		○デカトロン錠4mg	2 錠				
		【分1】1日1回:朝食後 カルボプラチン投与の翌日から内服。					
	コメント	day2-3、デカトロン内服。					