

レジメン名	GEM+nab-PTX療法
-------	---------------

1 クール	28 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射							
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		15 分で					
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管				
	2	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
		30 分で					
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶				
		フィルター使用不可					
		○アフラキサン点滴静注用100mg	125 mg /m ²				
		1V生食20mLで溶解、残りは抜取る					
	3	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液追加 [50mLV]	1 瓶				
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		30 分で					
		ブドウ糖注射液 5% [100mLV]	1 瓶				
		○ゲムシヒン点滴静注用1g(ジェムザール)	1000 mg /m ²				
	5	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液追加 [50mLV]	1 瓶				
処方							
コメント							