

レジメン名	2CDDP+VP-16+RT療法
-------	------------------

1 クール	28 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射							
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
		120分で					
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋				
		イトホ開始60分前イトホ内服					
		○アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット(アスパラガリウム)	1 キット				
		○補正用硫酸マグネシウム液(20mEq/20mL)	8 mL				
		投与量注意					
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
		15 分で					
		○グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](テカトロン)	1 瓶				
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](テカトロン)	2 管				
	3	DIV 点滴注射(速度指示)				時間未定	時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカリ [50mLV]	1 瓶				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](テカトロン)	1 瓶				
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		120分で					
		ブドウ糖注射液 5% [500mLB](大塚糖液)	1 袋				
		○イトホ点点滴静注液100mg「サント」(ラステット)	100 mg /m <sup>2</sup>				
		PVCフリーセット使用					
	5	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
		60 分で					
		○20%マンニトール注射液「YD」[300mL]	1 瓶				

注射	6	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定		
		120分で				
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋			
		○シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	80 mg /m <sup>2</sup>			
		遮光、全量500mLとする				
	7	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定		
		120分で				
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋			
		○アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット(アスパラカリウム)	1 キット			
	8	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定	時間未定	
処方		全開				
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶			
	9	IV 静脈内注射		時間未定	時間未定	
		ヘパリンロック				
		○ヘパリンNaロック100U/mLシリンジオートカ10mL	1 筒			
						
	1			●		
		○イミダゾピリセル125mg	1 C			
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法1日目、エトキシドの投与60分前に 内服。				
	2			●	→	
コメント		○イミダゾピリセル80mg	1 C			
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法2日目、3日目の、それぞれ朝食後 に内服。				
						
	1					●
		○デキサメタゾン錠4mg	2 錠			
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法4日目に内服。				
		day2-4、デキサメタゾン8mg投与。				

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。