

レジメン名	8AMR療法
-------	--------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射							
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
		15 分で					
		○アロキシ点滴静注パック0.75mg	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管				
	2	DIV 点滴注射(速度指示)				時間未定	時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		全開					
		○生理食塩液比加 [50mLV]	20 mL				
		30mL抜き取り、破棄する。					
処方 コメント		○カルセト注射用20mg「院内在庫なし」	40 mg /m ²				
		原則1Vを5mLで溶解する。					
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		全開					
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶				