




注射	7	DIV 点滴注射(速度指示)		時間未定					
		120分で							
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋						
		○アスパラギン酸カリウム注 10mEqキット(アスパラカリウム)	1 キット						
	8	DIV 点滴注射(速度指示)				時間未定		時間未定	
処方		全開							
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶						
									
	1			●					
		○イミドカプセル125mg	1 C						
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法1日目、カンプトの投与60分前に内服。							
	2			●	→				
		○イミドカプセル80mg	1 C						
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法2日目、3日目の、それぞれ朝食後に内服。							
	3			●	→	→			
		○テカトロン錠4mg	2 錠						
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。							
									
	1					●	→		
		○テカトロン錠4mg	2 錠						
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。							
									
	1							●	→
		○テカトロン錠4mg	2 錠						
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。							
コメント		UGT1A1が欠乏型の場合はCPT投与量70-80%に減量。 day2-4、9-10、16-17、テカトロン8mg内服。							

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。