

レジメン名	3CBDCA+VP-16療法
-------	----------------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射							
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
		15 分で					
		○アロキシ点滴静注パック [®] 0.75mg	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管				
	2	DIV 点滴注射(速度指示)				時間未定	時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		120分で					
		ブトウ糖注射液 5% [500mLB](大塚糖液)	1 袋				
		○イトボシ点滴静注液100mg「サント」(ラステット)	100 mg /m ²				
		PVCフリーセット使用					
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
		60 分で					
		ブトウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋				
		○カルボプラチン点滴静注液450mg「サント」	5 mg /AUC× (GFR+25)				
	5	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		全開					
		○生理食塩液比加 [50mLV]	1 瓶				
処方							
コメント							